



BETEGSÉGENKÉNTI HELYZETÉRTÉKELÉS


TÜDŐRÁK (NSCLC)

A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN NAGY A LEMARADÁS A TERÁPIÁKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBN - IDEJE CSELEKEDNI.

Az NSCLC-vel kapcsolatban végzett GAP analízis a diagnosztizáláshoz és kezeléshez való mérsékelt korlátozásokat tárt fel. A kombinált indikátor országoként közepes mértékű eltérés tapasztalható körülbelül 10 pontnyi különbségekkel. A betegek hozzáférése irányuló felkészülést (GAP, *Gearing up to Patient Access*) főként a regisztrált gyógyszerekhez való korlátozott hozzáférés mozgatja, amiért vagy a visszatérítés hiánya vagy pedig populációs korlátok okolhatók, ideértve a PD-1/PD-L inhibitorokra vonatkozó bizonyos megszorítások, aminek eredményeként mérsékelt arányban kezelnek betegeket ezzel a gyógyszercsoporttal.

BETEGSÉGTEHER


DALY* - 100 EZER FŐRE VETÍTVE



*egészségkárosodással korrigált életévek

ÖSSZEHAISONLÍTÁS

ÖSSZESÍTETT GAP INDIKÁTOR



NAGY MÉRTÉKŰ LEMARADÁS KÖZEPES MÉRTÉKŰ LEMARADÁS KIS MÉRTÉKŰ LEMARADÁS


MEGFELELÉS A NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

Az ESMO klinikai gyakorlati útmutatásokban ajánlott 25 gyógyszer átlagosan körülbelül 55-60%-a érhető el V4 országokban. Az újonnan engedélyezett gyógyszerek elérhetőségei között vannak bizonyos differenciák - az egyes országok között az eredmények 16 százalékpont mértékben eltérnek.




BETEGCÉLCSOPORT

PD-1/PD-L1




HOZZÁFÉRÉS A GYÓGYSZEREKHEZ


KEZELT BETEGEK SZÁMA (2021)



KEZELT POPULÁCIÓ ARÁNYA (%)



AZ ENGEDÉLYEZÉSTŐL A TÁMOGATÁSIG



JELMAGYARÁZAT

Az engedélyezés dátuma

A támogatásba befogadás dátuma

1162 Napok száma

FŐ PROBLÉMÁK

- A V4 országokban az NSCLC elleni gyógyszerek átlagos visszatérítési ideje több mint 2,6 év. Az országok között a visszatérítés legrövidebb és leghosszabb átlagos időtartama közötti különbség 2,0 év.
- A V4 országokban a PD-1/PD-L1 inhibitor gyógyszerekkel kezelt célpopulációba tartozó betegek aránya nagymértékben eltérő volt 2021-ben a V4 tagállamok között: a szlovákiai 4%-tól a magyarországi és lengyel 32-37%-on át a Csehországban tapasztalt 61%-ig.
- A DALY (fogyatékossgal eltöltött életévek) alapján a népesség tüdőrák miatti terheltsége az összes V4 országban jelentős.



G.A.P. PROJECT

A visegrádi országokban (Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia) 10 kiválasztott terápiás területen vizsgáltuk az innovatív gyógyszerekhez való hozzáférés és a diagnosztika terén mutatkozó lemaradást.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: GAPV4.EU

