



PRZEGLĄD CHOROBY


MUKOWISCYDOZA

RÓŻNICE W DOSTĘPIE DO TERAPII W KRAJACH V4 SĄ ISTOTNE – CZAS NA DZIAŁANIE

Ograniczenia w dostępie do leczenia i diagnostyki mukowiscydozy w regionie V4 różnią się znacząco pomiędzy państwami, a różnica między krajem o najwyższej i najniższej punktacji wynosi około 25 punktów. Głównymi przyczynami słabych wyników V4 są niski odsetek pacjentów leczonych z wykorzystaniem potrójnej terapii skojarzonej we wszystkich państwach poza Czechami oraz długi czas od rejestracji do refundacji leków.

OBCIĄŻENIE POPULACJI



DALY* - W PRZELICZENIU NA 100 000



*disability adjusted life-years

PORÓWNIANIE KRAJÓW

OGÓLNY GAP




ZGODNOŚĆ Z WYTYCZNYMI

Wytyczne praktyki klinicznej zalecają stosowanie 5 leków na mukowiscydozę spośród uwzględnionych w analizie. W każdym z ocenianych państw co najmniej 3 z nich są dostępne - zgodność z wytycznymi ocenia się na 60-80%.


POPULACJA DOCELOWA

KAFTRIO




DOSTĘP DO LEKÓW


LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW (2022)



POPULACJA LECZONA (%)



OD REJESTRACJI DO REFUNDACJI



LEGENDA

Data rejestracji □ Data refundacji ○

1162 Liczba dni

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Średni czas oczekiwania na refundację leków na mukowiscydozę w krajach grupy V4 wynosi 5 lat. Różnica pomiędzy najkrótszym i najdłuższym średnim czasem oczekiwania na refundację w poszczególnych krajach wynosi 1 rok.
- Finansowanie potrójnej terapii skojarzonej CF w ramach regularnej refundacji lub w ramach programów wczesnego dostępu została wprowadzona we wszystkich państwach V4 poza Polską w latach 2021–2022 – z bardzo różnymi wynikami: od 21% pacjentów z grupy docelowej leczonych na Węgrzech do 83% pacjentów z populacji docelowej leczonych w Czechach.



PROJEKT G.A.P.

Zmierzono różnice w dostępie do leków innowacyjnych i diagnostyki w wybranych obszarach terapeutycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja).

WIĘCEJ NA GAPV4.EU

